



AGENTE MICROBIANO DE USO AGRICOLA

Registro de venta 9079

Ficha TECNICA

COMPOSICION GARANTIZADA

Ingrediente activo: Esporas viables de *Bacillus subtilis*.

Ingredientes inertes: microtalcó u.s.p c.s.p; oligosacarinas u.s.p.; dispersantes u.s.p; emulsificantes u.s.p ; agentes estabilizadores y agentes lubricantes u.s.p

ESPECIFICACIONES

- Viabilidad de esporas por gramo: 2×10^9 esporas viables por gramo de producto.
- Porcentaje de pureza microbiológica: $\geq 95\%$
- pH: 5.0-6.0
- Humedad: $\leq 8\%$

EMPAQUE

Bolsa doypack trilaminada con foil de aluminio.

PRESENTACION

Polvo mojable en presentación de quinientos gramos (500 g) y mil gramos (1000g).

DOSIFICACION

CULTIVO	PATÓGENO	DOSIS	INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Arroz	<i>Rhizoctonia solani</i>	500g/Ha	Aplicar en aspersión, en el momento de la siembra o en los primeros 15 días después de germinada la semilla.
Rosas	<i>Botrytis cinerea</i>	2,5g-3g/L	Aplicar 8 días antes del corte y previo al corte.
Tomate	<i>Alternari solani</i>	2,5g-5g/L	Aplicar en aserción foliar cada 7 días durante la fas vegetativa, prefloración, floración, llenado y cosecha.
	<i>Pseudomonas syringae</i>	2,5g-5g/L	Aplicar en aserción foliar cada 7 días durante la fase vegetativa, prefloración, floración, llenado y cosecha.



Biox

Naturalmente BIOLÓGICOS!



CATEGORIA TOXICOLOGICA

III medianamente tóxico.

CONSERVACION

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar seco y preferiblemente a la sombra. No requiere refrigeración.

PRECAUCIONES

Uso agrícola. Mantener fuera del alcance de los niños. Destruir el envase y sus componentes después de usado. Evitar la ingestión o cualquier contacto innecesario con el producto.

ESTABILIDAD

Doce meses en empaque sellado a temperatura ambiente.

COMPATIBILIDAD

BACTOX WP es compatible con Benomyl, Fluidoxonil y Metalaxil-M. No debe mezclarse con otros pesticidas sufractantes o fertilizantes foliares sin antes realizar unas pruebas de compatibilidad o consultar al departamento técnico de Semillas Valle.

